STAHL UND EISEN.

Zeitschrift

für das

deutsche Eisenhüttenwesen.

Redigirt von

Ingenieur **E. Schrödter**, und Generalsecretär **Dr. W. Beumer**,
Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisenhüttenleute. Geschäftsführer der nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller.

für den
technischen Theil

für den
wirthschaftlichen Theil

21. Jahrgang.
1901.

Commissions-Verlag von **A. Bagel**
in **Düsseldorf.**

2. Halbjahr.
Heft 13—24.

Die Zeitschrift erscheint in halbjährlichen Heften.

Abonnementspreis
für
Nichtvereins-
mitglieder:
24 Mark
jährlich
excl. Porto.

STAHL UND EISEN.

ZEITSCHRIFT

Insertionspreis
40 Pf.
für die
zweigespaltene
Petitzelle,
bei Jahresinsert
angemessener
Rabatt.

FÜR DAS DEUTSCHE EISENHÜTTENWESEN.

Redigirt von

Ingenieur E. Schrödter,

und

Generalsecretär Dr. W. Beumer,

Geschäftsführer des Vereins deutscher Eisenhüttenleute,
für den technischen Theil

Geschäftsführer der Nordwestlichen Gruppe des Vereins
deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller,
für den wirtschaftlichen Theil.

Commissions-Verlag von A. Bagel in Düsseldorf.

Nr. 23.

1. December 1901.

21. Jahrgang.

Zur Genesis der lothringisch-luxemburgischen Minette.

Von L. Blum in Esch a. d. Alzette.

Eine von mir analysirte schwarze Minette
von Algringen enthielt:

	%
Kieselsäure	7,80
Eisenoxyd	81,29
Eisenoxydul	89,54
Thonerde	4,80
Kalk	6,04
Magnesia	1,22
Manganoxyd	0,46
Phosphorsäure	1,82
Kohlensäure	10,22

Wie aus folgender Berechnung ersichtlich ist,
besteht dieses Erz aus kohlensaurem Eisenoxydul,
Eisenoxyduloxyd und kieselsaurem Eisenoxydul:

Gefundener Kalkgehalt	6,04
Davon ab an 1,82 % Phosphor- säure als Calciumphosphat	2,15
Bleibt CaO	3,89

Gefundene Kohlensäure	10,22
Davon ab an 3,89 % CaO gebunden als Calciumcarbonat	3,05
Bleibt CO ₂	7,17
Davon ab an 1,22 % Magnesia gebunden als Magnesiumcarbonat	1,84
Bleibt CO ₂	5,88

Diese 5,88 % Kohlensäure können nur in
Verbindung mit Eisenoxydul als Ferrocyanat
vorhanden sein. Da das Moleculargewicht der
Kohlensäure 44, dasjenige des kohlensauren
Eisenoxyduls 115,88 ist, so beträgt der Gehalt
der betreffenden Minette an kohlensaurem Eisen-
oxydul $115,88 \times 5,88 = 15,35$ %⁴⁴. Vom gesammten
Gehalte an Eisenoxydul sind demnach 9,52 %
an Kohlensäure gebunden. Es bleiben also noch
33,54 - 9,52 = 24,02 % übrig, welche, da diese

Verbindung nicht im freien Zustande bestehen kann, nur mehr entweder als Oxyduloxyl (Magnetit) oder als Ferrosilicat vorhanden sein können. 31,29 % Eisenoxyl geben mit 14,08 % Eisenoxylul 45,37 % Eisenoxyluloxyl. Die jetzt noch übrig bleibenden 24,02 — 14,08 = 9,94 % Eisenoxylul sind, da sonst keine Säure mehr zu binden ist, an Kieselsäure zu Ferrosilicat gebunden.

Fast ganz als Ferrocarbonat vorhanden finden wir den Eisengehalt der folgenden kieseligen Minette von gelbgrüner Farbe von Grube Friede. Die Analyse derselben ergab:

Kieselsäure	6,98
Eisenoxyl	10,31
Eisenoxylul	37,36
Thonerde	3,77
Kalk	4,08
Magnesia	2,16
Manganoxyl	0,79
Phosphorsäure	1,95
Kohlensäure	26,69
Gefundener Kalkgehalt	4,08
Davon ab an 1,95 % Phosphorsäure gebunden als Calciumphosphat	2,31
Bleibt CaO	1,77
Gefundene Kohlensäure	26,69
Davon ab an 1,77 % Kalk gebunden als Calciumcarbonat	1,39
Bleibt CO ₂	25,30
Davon ab an 2,16 % Magnesia gebunden als Magnesiumcarbonat	2,37
Bleibt CO ₂	22,93

Diese 22,93 % können nur mehr an Eisenoxylul gebunden sein. 37,36 % Eisenoxylul erfordern hierzu 22,87 % Kohlensäure, um damit 60,23 % kohlen-saures Eisenoxylul zu bilden.

Interessanter noch in mineralogischer Beziehung gestaltet sich die folgende grünblaue Minette von Differdingen-Oberkorn. Die Analyse derselben ergab folgende Zusammensetzung:

Kieselsäure	14,02
Eisenoxyl	4,93
Eisenoxylul	34,27
Thonerde	5,13
Kalk	6,86
Magnesia	2,83
Manganoxyl	0,74
Schwefel	1,73
Phosphorsäure	1,72
Kohlensäure	18,75

Von dem Kohlensäuregehalte von 18,75 % werden, als an Calcium- und Magnesiumcarbonat gebunden, 8,50 % abgezogen. Es bleiben noch 10,25 %, welche mit Eisenoxylul zu kohlen-saurem Eisenoxylul verbunden sind. Hierzu sind 16,74 % Eisenoxylul erforderlich; es bleiben vom Gesamtgehalte also noch 17,53 % übrig, welche in anderer Verbindung zugegen sein müssen, da es ganz angeschlossen ist, dafs sie als freies Eisenoxylul vorhanden sein können.

Der beim Auflösen dieser Minette hinterbleibende Rückstand unterscheidet sich merklich von den Rückständen anderer Minetten. Er ist nämlich vollständig gallertartig und nach erfolgtem Glühen feinpulverig, während die Kieselsäurerückstände anderer Minetten gewöhnlich feinkörnig, quarzig sind und durch die Gegenwart vorhandener, ungelöster Silicate zuweilen beim Glühen theilweise zusammensintern. Im vorliegenden Falle stammt die Kieselsäure also von einer durch das Behandeln mit Säuren beim Auflösen zerstörten Verbindung her und nimmt deshalb an der Bindung von Basen theil. Da aber von vorhandenen Basen nur mehr Eisenoxylul zu binden ist, so mufs angenommen werden, dafs die Kieselsäure mit dem noch übrigbleibenden zu kiesel-saurem Eisenoxylul vereinigt ist. Hierzu sind 14,63 % Kieselsäure erforderlich. Die Differenz zwischen diesem Gehalte und dem durch die Analyse gefundenen Kieselsäuregehalte (14,02 %) rührt daher, dafs bei dieser Umrechnung die Bindung der Phosphorsäure und des Schwefels an Basen der Einfachheit halber weggelassen wurde. Die vorliegende graublaue Minette von Differdingen-Oberkorn wäre demnach als ein Ferrosilicocarbonat von der Formel FeCO₃.FeSiO₃, ähnlich dem bei Huelva in Spanien vorkommenden Mangansilicocarbonat, welches letzteres vielfach als Mangan-zuschlag im lothringisch-luxemburgischen Hüttenbetrieb Anwendung findet, anzusehen.*

Aus den eben angeführten Fällen ist also zu ersehen, dafs je nach ihrer Herkunft der fast vollständige Eisengehalt einer Minette als Oxyduloxyl, als Carbonat oder als Silicocarbonat zugegen sein kann. Der Vollständigkeit halber flechte ich hier einige weitere Eisenoxylulbestimmungen ein, welche ich im Laufe meiner Untersuchung angeführt habe; es ist daraus ersichtlich, dafs, mit zunehmender Tiefe der Lager, der Eisenoxylulgehalt derselben im allgemeinen zunimmt.

		Eisenoxylul
		%
Esch, Hangendes des rothen, sandigen	Lagers	1,34
Esch, Liegendes des rothen, sandigen	Lagers	1,41
"	Hoehl, rothes Lager	0,95
"	" graues "	1,01
"	" braunes "	8,06
"	" schwarzes Lager	14,38

Uebrigens haben Berthier** und Karsten † bereits im Jahre 1827 in dem blauen Erze von Hayingen das kohlen-saure Eisen erkannt. Auch Albrecht †† erwähnt das Vorkommen desselben.

* Nach meinen Untersuchungen hat die grüne Minette von Pierrevillers gleichfalls dieselbe Zusammensetzung wie die eben beschriebene.

** „Annales de chimie et de physique“, Paris 1827. XXXV. S. 247.

† „Annales des mines“, Paris 1828 (2) III. S. 253.
†† „Stahl und Eisen“ 1899 Nr. 7 und 8.

jedoch nur oberflächlich, ohne auf nähere analytische Daten einzugehen.

Ich bin etwas weitläufig auf das Vorhandensein dieser Verbindungen in den oolithischen Eisenerzen eingegangen, und zwar aus dem Grunde, weil das Vorkommen dieser Verbindungen in Widerspruch mit der bis heute gültigen Ansicht über die Entstehung der betreffenden Lager steht. Hiernach wird angenommen, daß dieselben durch Sedimentation, also durch allmähliche Ablagerung bei wahrscheinlich gleichzeitiger Mitwirkung mechanischer und metasomatischer Prozesse entstanden sind. Die Hauptbestandtheile unserer Lager, Eisen und Kalk, nimmt man darnach also als ursprünglich im Wasser gelöste Bicarbonate an. Diese Verbindungen würden dem lothringisch-luxemburgischen Meerbusen durch Quellen und Flüsse zugeführt und in demselben ausgebreitet. Durch Abgabe eines Moleküls Kohlensäure wurde der kohlen-saure Kalk abgeschieden, durch Sauerstoffaufnahme wurde das kohlen-saure Eisenoxydul oxydirt und fiel als Hydroxyd nieder, wobei die freiwerdende Kohlensäure als Lösungsmittel der Alkalisilicate in Thätigkeit treten konnte. Zu Zeiten, wo Lösungen zugeführt wurden, die hauptsächlich kohlen-sauren Kalk enthielten, bildeten sich die Kalkablagerungen; herrschte dagegen das Eisen vor, so entstanden die reicheren Eisenerzlager.

Wie schon erwähnt, steht diese Erklärungsweise für die Entstehung der oolithischen Lager mit dem Vorhandensein von Ferrocobonat in den Minetten in Widerspruch. Ist jene richtig, dann muß in den Minetten der ganze Eisen-gehalt als Eisenhydroxyd zugegen sein, denn aus kohlen-sauren Lösungen von Ferrocobonat fällt unter dem Einflusse einer Oxydation nur Eisenhydroxyd aus. Die nachgewiesene Anwesenheit von Ferrocobonat in den Minetten macht jene Anschauungsweise über deren Entstehung demnach hinfällig; es sei denn, daß nachgewiesen werde, daß dasselbe in späteren Perioden durch Reduction und Kohlensäureaufnahme aus dem Eisenhydroxyd entstanden sei.

An anderer Stelle* veröffentliche ich eine Mittheilung über das Vorkommen eines basischen Ferrisulfates, welches als Ausscheidung an den angemeinerten Stollenwänden der Concession Rudolph bei Ars a. d. Mosel gefunden wurde. Die Probe stellte eine lehmartige Substanz dar von gelbbrauner Farbe und folgender Zusammensetzung:

Kieselsäure und in Säuren unlöslicher Rückstand	16,65
Eisenoxyd	25,35
Schwefelsäureanhydrit	23,75
Kalk	3,64
Thonerde	2,57
Phosphorsäureanhydrit	0,77

* Verein Luxemburger Naturfreunde. „Fanna“ Jahrgang 1897 Nr. 3.

Rechnet man den in Säuren unlöslichen Rückstand ab, ferner Kalk und Thonerde als die gleichfalls vorhandene Phosphorsäure und an Schwefelsäure gebunden, dann bleibt ein mit neutralem Ferrisulfat gemischtes basisches Sulfat mit 64,74 % Eisenoxyd und 35,25 % Schwefelsäureanhydrit. Es kann auch ein Gemisch verschiedener basischer Ferrisalze sein. Das Mineral verdankt seine Entstehung den in den unteren oolithischen Eisenerzschichten häufiger auftretenden Pyriten, welche durch Verwitterung zu Ferrosulfat oxydirt werden nach der Gleichung:

Die, die Stollenwände durchsickernden Grubenwässer, welche das Ferrosulfat gelöst enthalten, verdampfen an der Luft, wobei gleichzeitig durch Sauerstoffaufnahme das Ferrosulfat in die Ferriverbindung übergeführt wird und sich als unlöslicher Niederschlag abscheidet. Diese Beobachtung war es, welche mich zuerst auf den Gedanken brachte, die Frage nach der Herkunft des Eisengehaltes der oolithischen Lager auf den Verlauf eines ähnlichen Oxydationsprocesses zurückzuführen. Das Bett und das Ufergelände des lothringisch-luxemburgischen Meerbusens, auf welches sich diese Schichten abgelagerten, bestand derzeit aus den bituminösen Schieferen der Posidonien-schichten. Diese zeichnen sich noch heute durch einen hohen Gehalt an Pyriten aus, welcher z. B. in der Umgegend von Aubange (Belgisch-Luxemburg) so groß ist, daß an eine industrielle Ausbeutung derselben geschritten werden könnte, wie aus Analysen erhellt, die ich darüber ausgeführt habe. Unter dem Einflusse der Atmosphärischen verwitterten die Pyrite; ihr erstes Oxydationsproduct war Ferrosulfat. Diese Verbindung, sammt den Trümmern der in Zersetzung begriffenen Schichten, bestehend aus unzersetzten Pyriten, schon abgeschiedenen schlammigen Ferrisulfaten und Kalkverbindungen, wurden durch Quellen und Flüsse dem Meerbusen zugeführt und über das Bett desselben ausgebreitet, wo dann einestheils, durch den Wellenschlag in Berührung mit dem Sauerstoff der Luft gebracht, die weitere Oxydation fortschritt, und anderntheils die Abscheidung des Eisengehaltes des noch vorhandenen Ferrosulfates durch Umsetzung mit im Wasser gelösten Carbonaten und Silicaten als Ferrocobonat und Ferrisilicat erfolgte. Damit wäre eine befriedigende Erklärung für das Vorhandensein dieser Verbindungen in den oolithischen Erzen gegeben.

Als Ausgangspunkt für die Herkunft des Eisengehaltes desselben ist nach dem oben Dargelegten also der Pyritgehalt des Posidonien-schiefers anzusehen, dessen erstes Oxydationsproduct, Ferrosulfat, dem Meere in gelöstem Zustande zugeführt wurde. Die Sedimentation erfolgte dann auf zweierlei Weise: Durch Oxy-

ation des Ferrosulfates, wodurch unlösliche Ferrisulfate sich abschieden, und durch doppelte Umsetzung des Erstgenannten mit gleichzeitig vorhandenen, gelösten Carbonaten und Silicaten, wobei die entsprechenden Ferro-Carbonate und -Silicate niedergeschlagen wurden.

Die derzeitigen Schichten müssen demnach fast ausschließlich aus einem Gemenge von Ferrisulfat-Ferrocarrbonat und -Silicat bestanden haben.

Im Verlaufe weiterer Umsetzungen ging das Ferrisulfat unter Verlust seiner Schwefelsäure

allmählich in Ferrihydroxyd über, das Ferrocarrbonat desgleichen durch Oxydation unter Freiwerden der damit verbundenen Kohlenensäure. Die Schichten, in welchen wir heute einen Gehalt an Eisen-Carbonat und -Silicat finden, waren nur unvollkommen jenen zersetzenden Agentien zugänglich. Auffallend ist

ihr gleichzeitiger hoher Schwefelgehalt. Bei den rothen, gelben und grauen Minetten Luxemburgs beträgt derselbe kaum einige Hundertstel Procente; bei manchen, Eisencarbonat enthaltenden Minetten hingegen steigt er zuweilen bis auf 2 %/o. So erklärt sich auch der vorhin erwähnte, mit zunehmender Tiefe steigende Gehalt an Eisenoxydul der hierauf untersuchten Minettelager des Escher Bassins. In den oberen Schichten ist der Zersetzungsprocess der Eisenverbindungen sozusagen beendigt; in den unteren

noch nicht, weil sie den zersetzenden Agentien schwerer zugänglich waren. Im grauen Lager von Rümelingen wurde eine compacte Pyritschicht von 10 bis 20 cm Mächtigkeit gefunden. Dieselbe ist als eine unzersetzt gebliebene Trümmermasse anzufassen, welche diesem aus dem Posidonienschiefer zugeführt wurde.